SOX療法

部位	胃
1コース日数	21日間

【レジメンスケジュール】

薬剤名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	…
TS-1 (S-1)	80mg/㎡	1日1回　朝・夕食後															休薬						➡2コース目	
オキサリプラチン (L-OHP)	130㎎/㎡	●																					●	

注射薬投与スケジュール	投与時間
① 生食 100mL	ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ
② グラニセトロン 3mg/100mL デキサート®注 4mg※1	30分間
③ L-OHP 5%糖液 250mL デキサート®注 4mg※2	2時間

※1 制吐剤は嘔気訴え等で変更もあり

※2 血管痛対策（pH緩衝剤）

［参考］

（表1） 重篤な骨髄抑制の基準

検査値	Grade1
白血球（WBC）	＜3,000/㎣
好中球（NEUT）	＜1,500/㎣
血小板（PLT）	＜75,000/㎣
ヘモグロビン（Hb）	＜8.0g/dL

（CTCAE v5.0-JCOGより）

【主にチェックする検査値】

WBC　NEUT　Hb　PLT　AST　ALT　Cre

【コース中止基準】

- 重篤な骨髄抑制（表1）のある患者
- 重篤な肝障害のある患者
- 重篤な腎障害のある患者（Ccr＜30mL/min）
- 非血液毒性≧Grade3

【主な副作用】

［共通］

- 骨髄抑制（WBC、NEUT、RBC、Hb、PLT低下）
- 口内炎　下痢　悪心・嘔吐　食欲不振
- 味覚障害　脱毛 など

［主にL-OHPによるもの］

- 血管痛（L-OHP投与時）　末梢神経障害

［主にS-1によるもの］

- 流涙